

Mora

En cultivo de Mora con poca capacidad de agua todo el año, se aplica dos veces al año en entrada de aguas (invierno) y salida de aguas (verano).

Protocolo 1 – Aplicación al Suelo

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Raíz (día 1) Enraizador | Viosil | Biofertilizante |
| Entrada de Aguas (Invierno) | 4 lts | 20 lts |
| Salida de Aguas (Verano) | 4 lts | 20 lts |
| Total | 8 lts | 40 lts |

En Cultivos de Mora con buena capacidad de agua todo el año, se aplica cada 4 meses.

Protocolo 2 – Aplicación al Suelo

| Raíz (día 1) Enraizador | Viosil | Biofertilizante |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1er Aplicación | 3 lts | 20 lts |
| 2da Aplicación a los 4 meses | 3 lts | 20 lts |
| 3ra Aplicación a los 8 meses | 3 lts | 20 lts |
| Total | 9 lts | 60 lts |

Se recomienda aplicar manualmente o vía fertirriego (si dispone) cada 4 meses desde la siembra y/o hasta que se cambie de cultivo/semilla

Preparación:

- 1.- En un tanque de 200 litros con Agua, ingreso el VIOSIL y agito la mezcla.
- 2.- Luego colocar el Biofertilizante y/o mezclarlo de nuevo
- 3.- Cada cargada de bombas o aguilón volver a agitar, ya que el VIOSIL es más pesado.